

Роспотребнадзор предупреждает: клещи атакуют

Наступил сезон активности клещей, пострадавших от их укусов среди населения Шарьинского муниципального района 2 человека, из них 1 ребенок, нападение клещей произошло на территориях частных домов в с. Рождественское и в д. Бычиха.

Все пострадавшие своевременно обратились за медицинской помощью, клещи исследованы на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита в лаборатории ОГБУЗ «Шарьинская ЦРБ», результаты отрицательные.

Сезон активности клещей апрель - октябрь. Согласно требованиям санитарных правил по профилактике инфекционных болезней акарицидным (противоклещевым) обработкам подлежат территории, наиболее часто посещаемые населением - это образовательные, оздоровительные, лечебно-профилактические учреждения, парки, скверы, кладбища.

Самым надежным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Вакцинация против клещевого энцефалита проводится круглогодично, но наиболее оптимальный вариант - весна и осень.

Схема вакцинации против клещевого вирусного энцефалита включает 2 прививки с интервалом 1 месяц, далее прививка проводится через год после законченной вакцинации и в последующем ревакцинация проводится каждые 3 года.

Также гражданам необходимо соблюдать меры неспецифической профилактики клещевого вирусного энцефалита:

- использование защитной (специальной) одежды, при её отсутствии одеваться таким образом, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей, носить однотонную светлую одежду, брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды заправлять в брюки, манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке или куртке;
- применение репеллентных препаратов для обработки верхней одежды от клещей;
- само- и взаимоосмотры на наличие клещей каждые 15 минут, контрольные через 2 часа;
- не заносить в помещения свежесорванные растения;
- не употреблять в пищу сырое козье молоко.

Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита включает в себя благоустройство территории, периодическое скашивание травянистой растительности.

При присасывании клеща необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение, так как введение иммуноглобулина против клещевого вирусного энцефалита рекомендуется не позднее четвертого дня после присасывания клеща.